

Информационный листок для пациентов по применению препарата КОРОНАВИР

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, фавипиравир 200 мг
у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Уважаемый пациент!

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по медицинскому применению, находящуюся в упаковке препарата КОРОНАВИР до начала применения препарата или вы можете найти ее в свободном доступе по ссылке в интернете: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=3d55e34c-c5d1-443d-9b50-43fa3b27f566&t= .

Если у Вас появятся вопросы при прочтении инструкции по медицинскому применению/данной информации или на протяжении курса применения препарата КОРОНАВИР, задайте их Вашему лечащему врачу или воспользуйтесь контактными данными, указанными в конце информационного листа.

ВАЖНО!

Препарат КОРОНАВИР врач назначает Вам индивидуально.

Не передавайте эти таблетки для приема другим лицам, даже если у них проявляются симптомы, похожие на Ваши!

Это может принести непоправимый вред здоровью другого человека!

Перед началом применения препарата Вам необходимо:

А. Сообщить своему врачу:

1. О наличии у Вас хронических или острых заболеваний, особенно, если Вы страдаете подагрой, у Вас есть нарушения сердечного ритма, заболевания сердца или вирусные гепатиты.
2. О тех лекарственных препаратах, которые Вы принимаете в настоящее время или планируете принимать в ближайшее время по назначению врача другого профиля.
3. О наличии или планировании беременности.
4. О том, являетесь ли Вы донором крови/спермы.
5. Если Вы кормите грудью.

Б. Пройти обследование, назначенное врачом:

1. Общий анализ крови, биохимический анализ крови и др. (по назначению врача).
2. Перед лечением Вам необходимо провести тест на беременность, если Вы являетесь женщиной репродуктивного возраста или менопауза наступила менее, чем 2 года назад (пожалуйста, используйте ультрчувствительные качественные тесты)

Во время приема препарата

У Вас могут проявиться побочные эффекты, указанные или не указанные в инструкции по применению.

Для контроля и своевременной корректировки лечения Вам необходимо:

1. Сообщать врачу об изменениях вашего самочувствия на фоне терапии препаратом КОРОНАВИР.
2. Сдавать анализы и проходить необходимые обследования по назначению врача
3. Для женщин репродуктивного возраста: применять надежные методы контрацепции или воздержаться от половых контактов на время лечения и в течении не менее чем 3 месяцев после окончания курса терапии.
4. Регулярно проводить обследования на возможное развитие беременности.

Во время приема препарата КОРОНАВИР могут проявляться побочные эффекты, в том числе могут измениться результаты лабораторных исследований (могут быть выше или ниже нормальных значений). Подробная информация о побочных эффектах указана в инструкции по медицинскому применению. Некоторые из побочных эффектов проходят в процессе лечения и не требуют отмены препарата. Решение о продолжении или отмене лечения необходимо обсудить с Вашим врачом.

СРОЧНО!

Сообщите Вашему врачу:

1. Если у Вас появились новые жалобы или усилились прежние
2. Если Вам назначено лечение другим врачом по поводу другого заболевания.
3. Если Вы планируете забеременеть.
4. Если ухудшились показатели в общем или в биохимическом анализах крови.
5. При появлении любых аллергических реакций: местные отеки, ларингит (першение, боль в горле, осиплость голоса), кожные аллергические реакции.
6. Если Вы начали самостоятельно дополнительно принимать:
 - Лекарственные травы.
 - Биологически активные добавки.
 - Активированный уголь или другие сорбенты.
7. При подозрении/подтверждении беременности.

Дополнительно проконсультируйтесь с Вашим врачом:

1. Если Вы женщина:

- При планировании беременности.
- Если Вы кормите грудью ребенка.

2. Если Вы мужчина:

- При планировании зачатия ребенка.
- При планировании сдать сперму в банк спермы.

Необходимо сообщить эту информацию Вашему врачу, назначившему КОРОНАВИР, даже если Вы уже обратились с этими жалобами к врачу другой специализации!

Беременность

Из-за высокого риска развития серьезных врожденных дефектов у ребенка женщинам репродуктивного возраста необходимо использовать надежные средства контрацепции для предупреждения беременности:

- а) Во время приема препарата КОРОНАВИР
- б) После окончания курса применения препарата КОРОНАВИР в течение не менее 3 месяцев после окончания курса терапии.

Прием препарата КОРОНАВИР связан с большим риском возникновения пороков развития у плода во время беременности.

Уважаемый пациент!

Обращаем Ваше внимание:

1. Не превышайте установленную врачом суточную дозу! Увеличение дозы не повлияет на эффективность лечения, а наоборот, увеличит риск развития побочных эффектов!
2. Если Вы по ошибке приняли больше требуемой дозы, **срочно** примите активированный уголь (в соответствии с инструкцией по его применению) и обратитесь к Вашему врачу, если Вы находитесь на лечении в стационаре, если у Вас нет возможности оперативно связаться с врачом – необходимо вызвать бригаду скорой помощи.
3. Если Вашу таблетку по ошибке принял другой человек (взрослый или ребенок), ему необходимо дать выпить возрастную дозу активированного угля (в соответствии с инструкцией по применению) и незамедлительно обратиться к врачу.

Уважаемый пациент, Вам не рекомендуется

Во время приема препарата КОРОНАВИР и в течение 3 месяцев после окончания терапии:

1. Быть донором крови/ плазмы и органов, так как они могут быть применены у беременных женщин, а это риск врожденных пороков развития у ребенка.
2. Быть донором спермы и/или сдавать сперму в банк спермы.

Обращаем Ваше внимание, что врач, по Вашей просьбе, может предоставить Вам информированное согласие. Данный документ содержит информацию о рисках тератогенного действия препарата и мерах контрацепции в период его применения и после лечения, в двух экземплярах, один из которых выдается на руки пациенту или его законному представителю, а второй сохраняется в медицинской документации пациента.

Контактные данные владельца РУ на препарат КОРОНАВИР:

ООО «Технология лекарств»

Адрес: 141401, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 31, пом. 21

Телефон: +7 (495) 225-62-00 (соединить с отделом медицинской информации или уполномоченным лицом по фармаконадзору).

Электронная почта: safety@drugsformulation.ru